Département de Mathématiques

Examen du 21 mai 2025

Durée deux heures, les documents et les téléphones portables sont interdits

1. Séries de Fourier (6) : Soit pour $x \in [-\pi, \pi]$

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 & -\pi/2 < x \le \pi \\ -1/2 & \text{sinon} \end{cases}$$

et $f(x + 2\pi n) = f(x), n \in \mathbb{Z}$.

- (a) Donner le graphe de f(x) pour $|x| \leq 3\pi$.
- (b) Calculer les coefficients de la série de Fourier. Donner les coefficients avec indices paires et impaires.
- (c) En conclure la décroissance des coefficients pour $n \to \infty$.
- (d) Donner la somme de la série pour $x = -\pi/2$.
- 2. Équation de Poisson (8):
 - (a) Résoudre analytiquement pour $x \in [-1, 1]$ l'équation

$$u''(x) + \pi^2 u(x) = -\pi^2 x^2, \quad u'(-1) = 0 \quad u(1) = 2/\pi^2 - 1.$$
 (1)

- (b) Écrire un code en Matlab pour calculer la solution de (1) numériquement. Utiliser le code cheb.m pour les matrices de différenciation. Prendre N=32 polynômes, donner le graphe de la solution, calculer la norme de la différence avec la solution exacte.
- 3. Stabilité: (4)

Pour l'équation différentielle y'(t)=f(t,y(t)), la méthode de Euler rétrograde prend la forme

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + hf(t_{n+1}, y(t_{n+1})),$$

où on applique la discrétisation $t=t_0,t_1,t_2,...$ et où $t_{n+1}-t_n=h,$ n=0,1,2,... Donner le domaine de stabilité. La méthode est-elle Astable?

Indication : Étudier l'équation $y'(t) = \lambda y(t)$, où la constante $\lambda \in \mathbb{C}$ a $\Re \lambda < 0$. Discuter le domaine de stabilité dans le plan complexe de $z = h\lambda$.

4. Équation Schrödinger (3) : L'équation d'Airy prend la forme

$$-\mathrm{i}\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 \psi(x,t)}{\partial x^2}, \quad \psi \in \mathbb{C}.$$

Donner les conditions aux limites $x=\pm \pi$ pour assurer une solution périodique sur tout $\mathbb R$. En utilisant des séries de Fourier, donner la solution du problème de Cauchy pour les conditions initiales $\psi(x,0)=f(x)$ où $f(x)=f(x+2\pi k),\ k\in\mathbb Z$.